

- Prevención -

Para las más jóvenes:

Las mujeres menores de 30 años tienen que continuar con el PAP (Papanicolaou) como método de prevención.

Las embarazadas no pueden realizarse el Test de VPH, solamente el PAP como parte del control prenatal.

*"Recordá que tener VPH,
no significa
tener Cáncer."*

Si tenes más de 30 años y no estás embarazada, en Tucumán disponemos de la más moderna metodología de prevención para el cáncer de cuello uterino, el Test de VPH.


Te lo puede realizar el médico junto al PAP o podes realizar una toma vos misma (auto-toma).

El estudio se realiza en toda la provincia.



*"Ante cualquier duda
visite el Caps u Hospital
más cercano a su domicilio"*

Cáncer de Cuello de Útero



Programa de Detección de
Cáncer Cervico-Uterino
Tucumán



www.msptucuman.gov.ar


MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA |  GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Programa de Detección de
Cáncer Cervico-Uterino
Tucumán



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA |  GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Cáncer de Cuello de Útero



Virus de Papiloma Humano

¿Qué es el VPH?

El Virus de Papiloma Humano (VPH) es un virus muy común que afecta a la mayoría de las personas, tanto mujeres como hombres, en algún momento de sus vidas.

Se transmite por contacto sexual.

Una persona puede haberse infectado con el VPH en algún momento de su vida sexual previa, y éste puede ser detectado mucho tiempo después.

El VPH generalmente desaparece solo.

Algunos tipos de VPH llamados de "Alto Riesgo", si persisten en el cuerpo pueden producir lesiones en el cuello del útero que, con los años, si no se tratan pueden convertirse en cáncer.

¿Cuáles son los Síntomas?

Inicialmente no presenta síntomas.

Cuando invade más áreas puede presentar:

- > Sangrado anormal después de mantener relaciones sexuales.
- > Períodos menstruales prolongados y abundantes.
- > Mayor secreción vaginal y dolor pélvico.

¿Cómo prevenir el cáncer de Cuello de Útero?

- > En niñas de 11 años, con la vacuna para el VPH.
- > Desde los 25 a los 29 años, con el PAP (Papanicolaou).
- > A partir de los 30 hasta los 64 años, con el Test de VPH.

La vacuna contra el VPH permite inmunizar contra el cáncer de cuello de útero.

El Calendario Nacional de Vacunación contempla la aplicación de dos dosis a todas las niñas de 11 años.

¿Qué es el Test de VPH?

El test detecta si en el cuello del útero hay o no, presencia del VPH de "Alto Riesgo".

Es un Test simple y seguro que no produce dolor.

Está recomendado para mujeres a partir de los 30 años. Se realiza con el método de doble toma (PAP + Test de VPH) en el servicio de salud o mediante una autotoma en el domicilio de la paciente.

¿Cómo se realiza el Test de VPH?

Es muy similar al PAP.

Un técnico o profesional del equipo de salud extrae una muestra de células del cuello del útero con un cepillo. La muestra se analiza en un laboratorio para detectar si hay presencia del VPH de "Alto Riesgo".

Si el resultado es negativo, sabemos que no hay VPH en el cuello del útero. Entonces, el próximo test hay que hacerlo dentro de tres años.

Si el resultado es positivo, un PAP nos dirá si hay lesiones que necesitan ser tratadas o simplemente controladas.

¿Cómo debe prepararse una mujer para hacerse un PAP?

La higiene debe ser normal, sin lavajes internos; no colocarse óvulos, cremas, talcos, ni jaleas.

Asegurarse de no estar menstruando.

No tener relaciones sexuales 24 horas antes de la toma de la muestra.