



# Sala de Situación de Salud



Hasta el día: 4 de Mayo  
Semana  
Epidemiológica:

**19**

**DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA**



MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE  
TUCUMÁN

# **Sala de Situación de Salud**



**Situación Regional e Internacional**



## Fiebre de Mayaro- América

El virus Mayaro (MAYV) se aisló por primera vez en Trinidad y Tobago en 1954

Brotes en la última década : residentes de las comunidades rurales de la región amazónica de Brasil, Bolivia, Perú y Venezuela (trabajadores de bosques tropicales húmedos)

El vector involucrado fue el mosquito del género Haemagogus que es de hábito silvestre



**2015: 1 caso confirmado en Haití**

**2018: 35 casos Perú**

**2019: 2 casos en Perú  
5 casos en Ecuador**


Fuente: OPS

# Dengue- América- Argentina

## Casos Reportados de Dengue en las Américas por País o Territorio. Casos Acumulados. 2019

| País     | Hasta SE | Probables | Casos confirmados | Incidencia | Serotipos | Casos de dengue grave | Muertes por dengue |
|----------|----------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------------------|--------------------|
| Bolivia  | 12       | 3.913     | 2.629             | 34,89      | DENV-1,2  | 9                     | 6                  |
| Brasil   | 14       | 439.432   | 210.339           | 208,39     | DENV-1,2  | 320                   | 122                |
| Chile    | 14       | 0         | 0                 | -          | -         | 0                     | 0                  |
| Paraguay | 14       | 2.397     | 172               | 34,75      | DEN-1,2,4 | 0                     | 1                  |

Casos positivos para dengue (confirmados y probables) según antecedente de viaje por SE de inicio de síntomas o consulta.  
Argentina. SE 1 a 16 de 2019.




Fuente: OPS-Secretaría de Salud de la Nación

## ETI- CHILE




Las atenciones hospitalarias por ETI corresponden al 0,2 % de las consultas totales (154.365) y se observaron por debajo del umbral estacional y el promedio de la curva epidémica en la SE 14.

En APS la tasa de notificación de ETI fue de 4,3 para la SE 14, manteniéndose por debajo del umbral estacional para el año 2019



FUENTE: Ministerio Salud Chile

## Número de consulta por ETI. Paraguay SE 1-15. 2019



**La tasa de notificación de consultas para la SE 15 fue de 225 x 100mil hab. La consulta por ETI representa el 8,4% del número de consultas total.**

FUENTE: Ministerio Salud de Paraguay



MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE  
TUCUMÁN


# Sala de Situación de Salud



**Situación en Tucumán**




## Vigilancia de Síndrome Febril inespecífico hasta la SE 18 de 2019 Provincia de Tucumán







## Corredor Endémico de Neumonía Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 17



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

## Corredor Endémico de ETI Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 17




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




## Corredor Endémico de ETI según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 17


ÁREA PROGRAMATICA CENTRO




ÁREA PROGRAMATICA ESTE



ÁREA PROGRAMATICA SUR



ÁREA PROGRAMATICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



## Corredor Endémico de Bronquiolitis Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 17




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




## Corredor Endémico de Bronquiolitis según Áreas Programáticas Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 17


ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO




ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE



ÁREA PROGRAMÁTICA SUR



ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

## Corredor Endémico de Bronquiolitis según Hospitales de Referencia Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 17


HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS




HOSPITAL "PTE. N. AVELLANEDA"



HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN



HOSPITAL "EVA PERÓN"



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




**Tasa de Bronquiolitis por  
1.000 hab. por Área  
Operativa y SE. Tucumán.  
Año 2019. Hasta SE 17**


[illegible]

## Internados (n=1262)


Proporción de virus  
respiratorios hasta SE 18 de  
2019  
Provincia de Tucumán



## Ambulatorios (n=69)



## Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 17




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
  - Zona de Seguridad
  - Zona de Alerta
  - Zona Epidémica
  - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0






## Corredor Endémico de Diarreas en menores de 5 años Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 17



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0


## Diarreas: Muestras positivas según etiología. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta la SE 16




| MUESTRAS             |       |
|----------------------|-------|
| Año 2019 hasta SE 16 |       |
| Positivas            | 325   |
| Procesadas           | 1751  |
| % Positividad        | 18,56 |

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

## Corredor Endémico de Varicela Provincia de Tucumán. Año 2019. Hasta SE 17



## Corredor Endémico de Parotiditis Provincia de Tucumán. Año 2019. Hasta SE 17




### REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos





## Corredor Endémico de Alacranismo Provincia de Tucumán. Año 2019. SE 17



Fuente: Fundación Miguel Lillo

### REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos


**50 personas fueron tratadas en 2019 con suero anti-alacránico (4.7% del total de casos notificados)**

**Fuente: Programa de Animales Ponzosñosos**

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



# Casos acumulados de meningitis Período 2017 – 2019. Hasta SE 18




# Meningitis Bacterianas según Etiología Año 2019 hasta SE 18


|                        |   |
|------------------------|---|
| Meningococo            | 0 |
| Neumococo              | 0 |
| Haemophilus Influenzae | 1 |
| TBC                    | 1 |
| Bacterianas/otras      | 3 |
| Bacteriana s/e         | 1 |
| Micóticas              | 0 |

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

**Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacterianas. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 18 (n=6)**



**Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales. Provincia de Tucumán. Año 2019 hasta SE 18 (n=5)**



**REFERENCIAS**

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica

Nº de Casos

