



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA


**ENFERMEDADES  
NO  
TRANSMISIBLES**

**CÁNCER  
COLORRECTAL**



# Mapas de tasas ajustadas por edad de cáncer colorrectal – año 2012

Incidencia




España:	33,1
Canadá:	35,2
<b>Argentina:</b>	<b>23,8</b>
Uruguay:	15,8

Source: GLOBOCAN 2012 (IARC)



Mortalidad



España:	12,3
EEUU:	9,2
<b>Argentina:</b>	<b>13,0</b>
Brasil:	8,0

Tasas por 100 mil habitantes

# Tasas ajustadas por edad de incidencia y mortalidad, según sexo en Argentina (por 100 mil habitantes) – Año 2012

International Agency for Research on Cancer




World Health Organization

Argentina  
ASR (W)



En Argentina la incidencia y mortalidad por cáncer colorrectal fue superior en varones.

En las mujeres el cáncer de mayor incidencia fue el de mama, con baja mortalidad.

En varones el cáncer de próstata mostró mayor incidencia, aunque también con baja mortalidad.




# Proporción de casos nuevos de cáncer Tucumán. 2010 – 2012. (N=1793)




En la provincia de Tucumán, el cáncer colorrectal ocupó el segundo y tercer lugar respectivamente en varones y mujeres, con respecto a otros tumores malignos.

**Proporción de casos nuevos de tumores del tracto digestivo, según sexo. Tucumán. 2010 – 2012. (N=277)**



**Mortalidad proporcional por Cáncer de Colorrectal y otros tumores de órganos digestivos, según sexo. Tucumán, 2001 – 2012. (N=6332)**



- El cáncer colorrectal fue el más frecuente de entre otros del tracto digestivo en ambos sexos.
- En mujeres ocupó el primer lugar en la mortalidad proporcional.

## 15 primeras causas de mortalidad por cáncer en varones, según regiones (Tasas por 100 mil habitantes) Argentina 2011

	TUCUMAN		NOA		NEA		CUYO		CENTRO		PATAGONIA
19,9	Broncopul	15,6	Prostata	25,2	Broncopul	24,8	Broncopul	39,3	Broncopul	26,5	Broncopul
15,4	Prostata	15,5	Broncopul	16,4	Prostata	21,9	Prostata	22,5	Colorect	18,4	Colorect
10,7	Colorect	8,0	Estomago	11,1	Colorect	15,9	Colorect	20,3	Prostata	14,8	Estomago
9,6	Estomago	7,7	Colorect	8,5	Estomago	11,1	Estomago	10,6	Pancreas	14,7	Prostata
7,2	Higado	6,4	Esofago	7,9	Esofago	8,8	Pancreas	8,5	Estomago	7,9	Pancreas
6,9	Esofago	6,2	Higado	6,5	Pancreas	7,5	Higado	6,4	Vejiga	7,1	Esofago
6,5	Pancreas	5,7	Pancreas	3,4	Renal	6,5	Esofago	6,4	Esofago	5,9	Renal
4,2	Vias bilia	4,6	Renal	3,6	Leucemia	5,4	Renal	6,4	Renal	5,2	Leucemia
4,2	Renal	3,8	Vias bilia	3,0	Higado	4,8	Leucemia	5,0	Leucemia	4,4	Higado
3,7	Linfoma_NH	2,7	Leucemia	2,9	Laringe	4,4	Vejiga	4,8	Higado	3,8	Linfoma_NH
3,0	SNC	2,5	Linfoma_NH	2,5	Vejiga	3,5	SNC	4,6	Linfoma_NH	3,2	Vejiga
2,8	Leucemia	2,4	SNC	2,5	SNC	2,8	Linfoma_NH	4,1	Laringe	3,1	SNC
2,5	Laringe	1,9	Laringe	2,3	Linfoma_NH	2,3	Vias bilia	3,3	SNC	3,0	Laringe
1,7	Vejiga	1,6	Vejiga	2,0	Vias bilia	2,1	MielomaM	2,3	Vias bilia	3,0	Vias bilia
1,1	Boca	1,1	Boca	1,4	Boca	2,1	Laringe	2,3	Boca	1,9	MielomaM


- En varones, en la región del NOA, el cáncer colorrectal ocupó el cuarto lugar entre las tasas de mortalidad por cáncer, mientras que en Tucumán fue la tercera causa de muerte por cáncer.
- En todas la regiones las principales causas de mortalidad fueron los cánceres broncopulmonar, próstata y colorrectal.

## 15 primeras causas de mortalidad por cáncer en mujeres, según regiones de Argentina (Tasas por 100 mil habitantes) 2011

	TUCUMAN	NOA	NEA	CUYO	CENTRO	PATAGONIA
24,0	Mama	16,6	Mama	29,1	29,3	Mama
11,6	Cervicouter	12,0	Cervicouter	13,0	17,7	Broncopul
9,0	Colorect	7,1	Colorect	10,3	15,7	Colorect
9,0	Pancreas	6,7	Broncopul	10,3	10,7	Cervicouter
6,8	Broncopul	6,3	Pancreas	8,5	9,9	Pancreas
5,4	Ovario	5,8	Estomago	6,1	6,3	Estomago
4,7	Estomago	5,3	Ovario	5,8	4,9	Ovario
4,7	Higado	4,5	Esofago	4,6	4,1	Esofago
4,3	Vias bilia	4,2	Leucemia	3,8	3,7	Vias bilia
3,5	SNC	3,0	Higado	3,6	3,3	Leucemia
3,0	Esofago	2,8	SNC	3,0	3,3	Higado
2,8	Renal	2,8	Vias bilia	2,7	3,1	Renal
2,7	Leucemia	2,6	Renal	2,6	2,5	Esofago
1,6	Linfoma_NH	1,7	Linfoma_NH	2,2	2,4	SNC
1,1	Cuerpo ut	0,9	Boca	1,7	2,2	Vejiga


- En mujeres, en la región del NOA y Tucumán, el cáncer colorrectal fue la tercera causa de muerte por cáncer; aunque con una tasa menor con respecto a la región Centro del País.
- En todas la regiones la principal causa de mortalidad estuvo representada por cáncer de mama.

# Mortalidad por Cáncer Colorrectal en Argentina, según provincias – tasas por 100 mil - Año 2011



# MORTALIDAD


## Mortalidad por Cáncer Hepatobiliar en Argentina, según provincias – tasas por 100 mil - Año 2011



La mortalidad por cáncer colorrectal fue superior en áreas metropolitanas, mientras que en el NOA predomina el cáncer hepatobiliar, con respecto al resto de las regiones del país; aunque con menores tasas (diapositivas 6 y 7)





## Tasa de Mortalidad por Cáncer de Colorrectal según años. Tucumán y Argentina, 2001 – 2012. (N=1289)




La tasa de mortalidad por cáncer colorrectal en Argentina fue superior a la de la provincia en ambos sexos a lo largo de la serie de años (2001 y 2012) y se observó una tendencia en ascenso en todas las series.


## Egresos según Departamentos – Años 2010 – 2012. Provincia de Tucumán



## Mortalidad según Departamentos – Años 2010 – 2012. Provincia de Tucumán



Tasas por 100 mil  
habitantes



En general la demanda de internaciones como la mortalidad por cáncer colorrectal, fue a predominio de los departamentos ubicados al sur y este de la provincia