


Fiebre Amarilla



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA



GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Precauciones

Tienen un mayor riesgo de desarrollar efectos adversos graves a la vacunación:

- * Embarazadas (si bien deberían vacunarse en situaciones de brotes de fiebre amarilla con alto riesgo de infección)
- * Niños entre 6 y 8 meses
- * Mayores de 60 años que se vacunan por primera vez contra la fiebre amarilla
- * Mujeres en periodo de lactancia hasta los 8 meses del bebé (inclusive)

QUIENES TENGAN ESTAS CONDICIONES DEBEN CONSULTAR CON MÉDICOS EXPERTOS EN EL TEMA ACERCA DE RIESGOS Y BENEFICIOS DE LA VACUNACIÓN.

Contraindicaciones

No pueden recibir la vacuna:

- * Niños menores de 6 meses
- * Antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes de la vacuna: huevo, proteínas de pollo o gelatina
Alteraciones del sistema inmune
- * Enfermedad del timo
- * Miastenia gravis y síndrome de DiGeorge
- * Infección por VIH y otras inmunodeficiencias, tumores malignos, trasplantes, entre otros
- * Tratamientos inmunosupresores e inmunomoduladores



LOS POSIBLES EFECTOS ADVERSOS DE LA VACUNACIÓN PUEDEN SER MAYORES QUE LOS RIESGOS DE ADQUIRIR LA INFECCIÓN.