

EL NOMBRE DE ESTE ARCHIVO DEBE SER IGUAL AL DEL EXAMEN MAS " - RC". EJ: PSICOLOGIA (B) - SAN JUAN -RC

EXAMEN	CLINICA (PB) - TUCUMAN
PREGUNTA	RESPUESTA
1	A
2	D
3	A
4	B
5	D
6	A
7	C
8	D
9	A
10	D
11	A
12	C
13	B
14	A
15	B
16	C
17	D
18	A
19	A
20	D
21	B
22	A
23	D
24	D
25	C
26	C
27	D
28	B

INDICAR EL NOMBRE
PSICOLOGIA (B) - SA

INDICAR CADA RESP
A, B, C o D

29	A
30	B
31	B
32	A
33	B
34	B
35	D
36	D
37	C
38	D
39	C
40	D
41	C
42	D
43	C
44	A
45	D
46	D
47	C
48	C
49	C
50	C
51	B
52	D
53	D
54	B
55	A
56	D
57	C
58	D
59	D
60	A
61	C
62	A
63	C
64	D

65	B
66	A
67	D
68	A
69	B
70	B
71	C
72	D
73	D
74	C
75	A
76	D
77	D
78	D
79	C
80	D
81	B
82	B
83	D
84	A
85	C
86	A
87	D
88	D
89	A
90	D
91	A
92	B
93	B
94	D
95	A
96	B
97	B
98	B
99	A
100	D

TITULO	TEXTO
Item Nro	1
Enunciado	¿Cuál es el estudio más adecuado para evaluar paciente con Fracaso renal agudo en un varón?
Distractor	Eco vesical
Distractor	TC urografía
Distractor	Estudio funcional renal
Distractor	Urocultivo
Item Nro	2
Enunciado	¿Cuál de las siguientes condiciones cardiacas es la causa más probable de edemas, rales, e hipotensión en un paciente con insuficiencia cardiaca congestiva?
Distractor	Prolapso de válvula mitral
Distractor	Fallo cardiaco con fracción de eyección conservada
Distractor	Cardiopatía hipertrófica obstructiva
Distractor	Cardiomiopatía restrictiva
Item Nro	3
Enunciado	¿Cuál de los siguientes screening es el recomendado para el hijo de un paciente con diagnóstico de cáncer colorrectal?
Distractor	Colonoscopia a los 40 años
Distractor	Referir a test genéticos
Distractor	Colonoscopia a los 50 años
Distractor	Colonoscopia a los 45 años
Item Nro	4
Enunciado	En adición a fluidos IV y obtener cultivos sanguíneos cuál es el más importante y próximo paso a seguir en el manejo de un paciente con sepsis?
Distractor	Obtener RX de pie
Distractor	Instalar piperacilina tazobactam
Distractor	Medir saturación venosa central de O2
Distractor	Medir PVC
Item Nro	5
Enunciado	Un paciente de 12 años se presenta con adenopatía cervical izquierda de 14 días de evolución. ¿Cuál es el estudio más apropiado para el diagnóstico?
Distractor	Test rápido para infección por estreptococo
Distractor	Iniciar 5 días de prednisona
Distractor	7 días de amoxicilina clavulanico
Distractor	Biopsia escisional
Item Nro	6
Enunciado	¿Cuál de las siguientes estrategias es la más apropiada para el manejo de un quiste de ovario?
Distractor	Observación
Distractor	Laparoscopia y remoción del quiste
Distractor	Ca 125
Distractor	Laparotomía, exploración abdominal y remoción del quiste
Item Nro	7

Enunciado	¿Cuál de los siguientes tratamientos empíricos son los mejores para un paciente con tumefacción de la articulación de la cadera?
Distractor	Observación sin tratamiento empírico
Distractor	Colchicina
Distractor	Ceftriaxona y vancomicina
Distractor	Glucocorticoides intraarticulares
Item Nro	8
Enunciado	Mujer de 80 años internada por episodios de vértigos, cefalea persistente, mal estado general. Tensión arterial: 110/65 mmHg, freq. resp: 12x'; sin derrame, marcha atáxica, Romberg +, abdomen normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable para dar diagnóstico?
Distractor	Ecocardiograma transtoracico
Distractor	ANCA
Distractor	FAN
Distractor	Biopsia de arteria temporal
Item Nro	9
Enunciado	¿Cuál es la terapia inicial más apropiada para el síndrome de vena cava superior causado por un tumor de pulmón?
Distractor	Terapia radiante
Distractor	Quimioterapia con platino
Distractor	Glucocorticoides
Distractor	Heparinización IV
Item Nro	10
Enunciado	¿Cuál de las siguientes terapias es la más apropiada para el tratamiento de severa hipercalemia?
Distractor	Resina de poliestireno sulfato rectal
Distractor	Cloruro de calcio IV
Distractor	Furosemida IV
Distractor	Insulina y dextrosa
Item Nro	11
Enunciado	Mujer de 32 años con 3 días de fotofobia, dolor y visión borrosa en ojo derecho, sin antecedentes de trauma ocular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
Distractor	Uveítis
Distractor	Cataratas
Distractor	Glaucoma
Distractor	Desprendimiento de retina
Item Nro	12
Enunciado	Mujer de 68 años 3 semanas después de un IAM anterior con elevación del ST, se coloca stent. ¿Cuál es el manejo más apropiado para esta paciente?
Distractor	Hospitalizar al paciente con heparina no fraccionada
Distractor	TC de Tórax con protocolo para TEP

Distractor	Iniciar colchicina y dosis de aspirina
Distractor	Altas dosis de prednisona
Item Nro	13
Enunciado	Varón de 55 años con colitis ulcerosa con remisión oral y rectal con mesalazina ,es hospitalizado día 4 de internación empeora dolor abdominal ,39°, Frec. card: 110 X., Tensión Arterial: 98/60
Distractor	Iniciar ciprofloxacina más metronidazol
Distractor	Colectomía urgente con ileostomía terminal
Distractor	Aumentar metilprednisolona IV
Distractor	Considerar cirugía si ocurre dilatación colónica
Item Nro	14
Enunciado	¿Cuál de las siguientes intervenciones es más probable de mejorar la supervivencia de un paciente con insuficiencia respiratoria aguda?
Distractor	Ventilación con bajo volumen corriente
Distractor	Una estrategia conservadora de fluidos
Distractor	PEEP alta
Distractor	Ventilación con presión de vía aérea
Item Nro	15
Enunciado	¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más adecuado para un paciente asintomático de insuficiencia cardíaca congestiva?
Distractor	Administrar suplementos de Na.
Distractor	Restricción de fluidos
Distractor	Furosemida en bolos
Distractor	Dextrosa al 5% +0,45 salina
Item Nro	16
Enunciado	¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más apropiado para un paciente de 59 años que sufre de enfermedad inflamatoria intestinal?
Distractor	Acidofilofago
Distractor	Transplante de materia fecal
Distractor	Vancomicina
Distractor	Fidaxomicina
Item Nro	17
Enunciado	Varón de 83 años febril, presión arterial:110/70, frecuencia cardiaca :144, Glóbulos Blancos: 12.000/mm3, ausencia de entrada de aire en pulmón izquierdo . ¿Cuál sería la conducta?:
Distractor	Descompresión con aguja
Distractor	Rx. de tórax con portátil,
Distractor	TAC de tórax con contraste IV
Distractor	Tubo de toracotomía con drenaje
Item Nro	18
Enunciado	Un paciente con erupciones cutáneas desde hace 2 días que empeoran progresivamente típicamente con un eritema sin bullas, rash del 40% de la superficie corporal. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

Distractor	Necrosis epidérmica tóxica
Distractor	Síndrome de Stevens Johnson
Distractor	Pustulosis exantemática aguda generalizada
Distractor	Erupciones por drogas
Item Nro	19
Enunciado	¿Cuál de las siguientes causas es la más probable en un paciente con falla renal aguda?. Tienen 12 células rojas, 21 glóbulos blancos, cilindros leucocitarios, no bacterias.
Distractor	Nefritis intersticial aguda
Distractor	Nefropatía por IGA
Distractor	Pielonefritis
Distractor	Glomerulonefritis posinfecciosa
Item Nro	20
Enunciado	Mujer de 48 años, se prepara para biopsia hepática secundaria a hepatopatía por virus C, tiene
Distractor	Injuria pulmonar aguda secundaria a transfusión
Distractor	Sobrecarga circulatoria asociada a transfusión
Distractor	Toxicidad por citrato
Distractor	Reacción anafiláctica
Item Nro	21
Enunciado	Varón de 82 años, ingresa con cefalea, náuseas, vómitos, de 2 días de evolución, en la mañana para glucemia normal. en el Gram se observan cocos positivos. ¿Qué antimicrobiano debe
Distractor	Rifampicina
Distractor	Ampicilina +Gentamicina
Distractor	Aciclovir
Distractor	Cloranfenicol
Item Nro	22
Enunciado	¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más apropiado para un paciente estable hemodinámico
Distractor	Diltiazem
Distractor	Labetalol
Distractor	Digoxina
Distractor	Amiodarona
Item Nro	23
Enunciado	¿Cuál de los siguientes contraceptivos hormonales es el más apropiado para un paciente con
Distractor	Parches combinados
Distractor	Noretisterona/valerianato de estradiol inyectable
Distractor	Baja dosis de contraceptivo oral píldora
Distractor	Acetato de medroxiprogesterona de depósito
Item Nro	24

Enunciado	Varón de 20 años, con masa testicular palpable de 2,5 x1,5 cm, test izquierdo sin linfadenop
Distractor	Radiación extensa del testículo afectado
Distractor	Orquidectomía radical transescrotal
Distractor	Escisión de la masa con preservación del testículo afectado
Distractor	Orquidectomía radical inguinal
Item Nro	25
Enunciado	Mujer de 59 años, coronaria, infecciones urinarias recurrentes, reporta 4 días de diarrea. Ha diarrea se resuelve. 7 días después vuelve a tener diarrea, sin escalofríos, sin fiebre, 3 a 4 d
Distractor	Acidofilofago
Distractor	Transplante de materia fecal
Distractor	Vancomicina oral
Distractor	Fidaxomicina
Item Nro	26
Enunciado	¿Cuál de los siguientes tests está indicado en cirugía de válvula mitral electiva en un varón
Distractor	Stress farmacológico con perfusión miocárdica
Distractor	Test stress con ejercicio
Distractor	angiografía coronaria
Distractor	ecocardiograma transesofágico
Item Nro	27
Enunciado	¿Cuál de los siguientes estudios está indicado para un paciente con artritis erosiva deforma
Distractor	RMN de cuello
Distractor	Test de función pulmonar
Distractor	Radiografía de tórax
Distractor	Radiografía de columna cervical
Item Nro	28
Enunciado	En adición a fluidos IV y ATB cuál de los siguientes tratamientos es el recomendado para u
Distractor	Colecistectomía percutánea
Distractor	Colecistectomía laparoscópica dentro de las 72 hrs
Distractor	Colangiografía endoscópica retrograda
Distractor	No intervenir
Item Nro	29
Enunciado	¿Cuál de los siguientes tests diagnósticos es el más adecuado para un paciente con fiebre
Distractor	Eco transesofágico
Distractor	Examen fondo de ojo con dilatación
Distractor	PCR
Distractor	Scan con glóbulos blancos marcados
Item Nro	30

Enunciado	Un paciente con sospecha de trombocitopenia inducida por heparina, IRC complicado con t
Distractor	Continuar observación sin agregar nuevos anticoagulantes
Distractor	Instalar argatroban
Distractor	Transfusión de plaquetas
Distractor	Instalar aspirina
Item Nro	31
Enunciado	¿Cuál es el diagnóstico más probable en un paciente con dolor abdominal artralgiyas, hemat
Distractor	Glomerulonefritis post infecciosa
Distractor	Purpura de Schonlein Henoch
Distractor	Nefritis lúpica
Distractor	Necrosis tubular aguda
Item Nro	32
Enunciado	Mujer de 68 años, con comenzó con edemas progresivos de varios meses. Antecedentes de
Distractor	Discontinuar ibuprofeno
Distractor	Discontinuar amlodipina
Distractor	Ultrasonido doppler renal
Distractor	Iniciar prednisona
Item Nro	33
Enunciado	¿Cuál es el diagnostico en un paciente con historia de pérdida de peso de 12 meses de evol
Distractor	Tiroiditis subaguda
Distractor	Enfermedad de graves
Distractor	Bocio multinodular toxico
Distractor	Tiroiditis silente
Item Nro	34
Enunciado	Mujer de 76 años con enfermedad coronaria HTA, diabetes 2, osteoartritis por lo cual se pro apropiada para este paciente?
Distractor	Con aspirina y clopidogrel cirugía ahora
Distractor	Demorar cirugía hasta 6 meses después de la colocación de stent
Distractor	Demorar cirugía hasta 3 meses después de colocación de stent
Distractor	Suspender clopidogrel pero continuar con aspirina y proceder a cirugía ahora
Item Nro	35
Enunciado	¿Cuál de los siguientes antibióticos es el más adecuado para un paciente admitido en terap
Distractor	Vancomicina
Distractor	Cefazolina
Distractor	Metronidazol
Distractor	Aampicilina sulbactam
Item Nro	36
Enunciado	En adición a hidratación, ¿cuál es el manejo inicial más apropiado para la hipercalcemia sev

Distractor	Calcitriol
Distractor	Denosumab
Distractor	Furosemida más cinacalcet
Distractor	Pamidronato
Item Nro	37
Enunciado	¿Cuál es el diagnóstico más probable en un varón de 66 años con dilatación medio pupilar,
Distractor	Úlcera de cornea
Distractor	Uveítis
Distractor	Glaucoma agudo de ángulo estrecho
Distractor	Abrasión de cornea
Item Nro	38
Enunciado	¿Cuál de los siguientes medicamentos es el que más probablemente reduce el riesgo cardi
Distractor	Aspirinas
Distractor	Bloqueantes ECA
Distractor	Diuréticos de asa
Distractor	Estatinas
Item Nro	39
Enunciado	¿Cuál de los siguientes es el manejo más adecuado para una mujer de 80 años con estenos
Distractor	Referir para CDI
Distractor	Prescribir un bloqueante de receptor de angiotensina
Distractor	Referir a reemplazo valvular aórtico
Distractor	Valvuloplastia con balón percutánea
Item Nro	40
Enunciado	¿Cuál de los siguientes estudios es el más apropiado para un varón de 65 años quien esta r
Distractor	Test de antígeno para histoplasma urinario
Distractor	Broncoscopía con lavaje broncoalveolar
Distractor	Test tuberculina
Distractor	Espujo inducido, cultivo, BAAR
Item Nro	41
Enunciado	Mujer de 60 años con diabetes 2 ,tratados con 30 U de insulina glargina a la noche y 5 U de la
Distractor	Discontinuar insulina pandrial
Distractor	Admitir para monitoreo para chequear insulina y péptido C
Distractor	Reducir dosis de insulina 20%
Distractor	Reemplazar glargina por liraglutida
Item Nro	42
Enunciado	¿Cuál de los siguientes estados clínicos es el que corresponde a un paciente con serología
Distractor	Portador de hepatitis B

Distractor	Infección crónica de hepatitis B
Distractor	Inmunización previa por virus de hepatitis B
Distractor	Infección previa por virus hepatitis B
Item Nro	43
Enunciado	¿Cuál de los siguientes tests es el más apropiado para un viejo fumador con EPOC, dolor d
Distractor	RMN de hombro
Distractor	Electromiograma
Distractor	Rx de tórax
Distractor	Radiografía de hombro derecho
Item Nro	44
Enunciado	¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más adecuado para un paciente hemodinámico
Distractor	Largo tratamiento con heparina de bajo peso molecular subcutáneo
Distractor	Heparina de bajo peso molecular con transición a warfarina
Distractor	Heparina sódica IV con transición a warfarina
Distractor	Trombolisis seguida por heparina IV y transición a warfarina
Item Nro	45
Enunciado	En adición a endoscopia alta ¿cuál de los siguientes tratamientos está indicado para iniciar
Distractor	Albumina IV
Distractor	Nadolol
Distractor	N acetil cisteína
Distractor	Ceftriaxona
Item Nro	46
Enunciado	¿Cuál es la causa de un dolor en antepie que es peor de noche, en un varón de 60 años, dia
Distractor	Dolor isquémico
Distractor	Pie de charcot
Distractor	Pseudogota
Distractor	Dolor neuropático
Item Nro	47
Enunciado	¿Cuál test de laboratorio sería + en un varón de 14 años, con defectos en el esmalte dental,
Distractor	Hormona estimulante de tiroides
Distractor	Dosaje de zinc
Distractor	Anticuerpos antitransglutaminasa IG A
Distractor	Factor de crecimiento insulina like tipo
Item Nro	48
Enunciado	¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más apropiado para un paciente con anemia hem
Distractor	Ig IV
Distractor	Azatioprina
Distractor	Prednisona
Distractor	Esplenectomía
Item Nro	49

Enunciado	¿Cuál de las terapias es la más apropiada para un paciente con infección superficial del sitio?
Distractor	Apertura, lavado por incisión, cambio de tela adhesiva + vancomicina, piperacilina tazobactam IV.
Distractor	Apertura y lavado por incisión y azitromicina oral
Distractor	Apertura,lavado por incisión, remoción de tejido necrótico con cambios seriados de tela adhesiva
Distractor	Vancomicina IV hasta que el eritema se resuelva
Item Nro	50
Enunciado	¿Cuál es la causa más probable de dolor dorsal en un varón con cáncer de próstata que continúa con el dolor?
Distractor	Hernia de disco
Distractor	Compromiso de cuerda espinal
Distractor	Fractura osteoporótica
Distractor	MTS óseas no detectables
Item Nro	51
Enunciado	¿Cuál de las siguientes evaluaciones es la de más rendimiento diagnóstico en un adulto que presenta síntomas de hipertiroidismo?
Distractor	Medición de metanefrina
Distractor	Medición de glucosa en el momento de los síntomas
Distractor	Medición de TSH
Distractor	CLU en orina de 24 hs.
Item Nro	52
Enunciado	¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable en un paciente que tiene asma y empujamiento pulmonar?
Distractor	Neumonía por pseudomona
Distractor	Neumonía eosinofílica crónica
Distractor	Neumonía bacteriana atípica
Distractor	Aspergillosis broncopulmonar alérgica
Item Nro	53
Enunciado	¿Cuál Consejo nutricional es el más adecuado para una mujer obesa, sedentaria, quien sigue con un déficit de vitamina D?
Distractor	Comer pescado 4 veces por semana
Distractor	Evitar consumo de cafeína
Distractor	Iniciar suplemento de vit D
Distractor	Iniciar suplemento de B12
Item Nro	54
Enunciado	¿Cuál es el próximo estudio a efectuar en un varón de 66 años, sin casa PPD +,y un exudado pleural?
Distractor	Espudo para BAAR
Distractor	Biopsia pleural
Distractor	Amilasa en líquido pleural
Distractor	Citología de líquido pleural
Item Nro	55
Enunciado	¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable en un varón de 53 años que tiene un soplo sistólico aórtico?
Distractor	Regurgitación aórtica
Distractor	Insuficiencia pulmonar

Distractor	Cardiomiopatía hipertrófica
Distractor	Estenosis mitral
Item Nro	56
Enunciado	¿Cuál es el diagnóstico más probable en un varón de 15 años con una lesión esclerótica en
Distractor	Osteoma osteoide
Distractor	Osteomielitis crónica
Distractor	Osteosarcoma
Distractor	Sarcoma de Ewin
Item Nro	57
Enunciado	¿Cuál es el diagnóstico más probable en una mujer de 82 años quien tiene hinchazón en ro
Distractor	Radiografía de pie de rodilla derecha
Distractor	Artrocentesis de rodilla derecha
Distractor	Medición de ácido úrico en suero
Distractor	RMN de rodilla derecha
Item Nro	58
Enunciado	En adición a la recomendación de pérdida de peso y ejercicios, cuál de los siguientes pa esplenomegalia y test negativos para virus B y C y autoanticuerpos?
Distractor	Repetir enzimas hepáticas en 6 meses
Distractor	Referir para by pass en Y de Roux
Distractor	Efectuar RMN de hígado
Distractor	Efectuar Punción Biopsia Hepática
Item Nro	59
Enunciado	¿Cuál de las siguientes estrategias de manejo es la más adecuada para una mujer joven con
Distractor	Fosfomicina empírica
Distractor	Trimetoprima sulfametoxazol
Distractor	Ecografía renal
Distractor	Cultivo de orina + ciprofloxacina oral
Item Nro	60
Enunciado	¿Cuál de las siguientes profilaxis para TVP es la mas apropiada para un paciente de 29 año
Distractor	Heparina de bajo peso molecular durante la hospitalización y 6 semanas después de alta
Distractor	Heparina no fraccionada 12 hrs después del procedimiento y continuado por 48 hrs
Distractor	Heparina de bajo peso molecular 2 semanas luego del alta
Distractor	Aspirina diaria
Item Nro	61
Enunciado	¿Cuál es el paso más adecuado en la evaluación de una mujer de 46 años con una semana d de creatinina, eosinofilia periférica, piuria y proteinuria nmoderada?
Distractor	Medir ANCA C
Distractor	Medir títulos de ASLO

Distractor	Discontinuar amoxi clavulanico
Distractor	Medir eosinofilos en orina
Item Nro	62
Enunciado	¿Cuál de las sgtes terapias de primera línea es la más apropiada para una mujer de 75 años
Distractor	Citalopran
Distractor	Quetiapina
Distractor	Oxycodona acetaminofeno
Distractor	Halopieridol
Item Nro	63
Enunciado	¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable en un paciente con síndrome de tú
Distractor	Déficit de vit B12
Distractor	Enfermedad de cambios mínimos
Distractor	Hipotiroidismo
Distractor	Linfoma de células T
Item Nro	64
Enunciado	¿Cuál de las siguientes medicaciones es la más apropiada para un paciente con fracción de
Distractor	Doxazocina
Distractor	Atenolol
Distractor	Hidroclorotiazida
Distractor	Terazocina
Item Nro	65
Enunciado	¿Cuál de los siguientes hallazgos es que se ve con más frecuencia en el cultivo de esputo c
Distractor	Cocos gram + pleomorficos
Distractor	Mycobacterium avium
Distractor	Diplococos gram +
Distractor	Levaduras
Item Nro	66
Enunciado	¿Cuál de los siguientes pasos es el más adecuado para un paciente con enfermedad de Crohn, adenoma del colon izquierdo de 1,2 cm, quiste de 4,1 cm en riñón derecho con pared delgada, sin septos
Distractor	Colangiorensonancia para caracterizar masa ocupante pancreática
Distractor	Test función hepática
Distractor	Biopsia esplénica
Distractor	Ultrasonografía renal
Item Nro	67
Enunciado	Mujer de 57 años en post operatorio de cirugía de rodilla fue medicada con oxycodona ,fue 1mm. Incision quirúrgica bien. En adición al laboratorio ¿cuál es la conducta más adecuada
Distractor	Administrar fisostigmina, sobredosis de anticolinérgicos

Distractor	ATB amplio espectro para sepsis a punto de partida de cirugía de rodilla
Distractor	Flumazenil para sobredosis de opiáceos
Distractor	Naloxona por sospecha de intoxicación de opioides
Item Nro	68
Enunciado	En adición a monitoreo de presión arterial ambulatorio, ¿cuál de los siguientes tests es el m
Distractor	Medición de presión arterial de miembros inferiores
Distractor	Medición de metanefrina urinarias
Distractor	Medición de esteroides urinarios
Distractor	TAC de cerebro
Item Nro	69
Enunciado	Mujer de 39 años con bronquiectasias, disnea, hipersomnia leve, signos vitales estables. RX
Distractor	Consulta con Neumólogo para fibrobroncoscopia
Distractor	Angiografía intervencionista
Distractor	Análisis de esputo para BAAR
Distractor	Videotoracoscopia
Item Nro	70
Enunciado	¿Cuál de los siguientes pasos es el más recomendado para un paciente de 35 años, con dis
Distractor	Esofagogastroduodenoscopia
Distractor	Test urea espirada
Distractor	Terapia empírica con lanzoprazol, amoxicilina, claritromicina sin test para infección por helicobacte
Distractor	Test ph esofágico
Item Nro	71
Enunciado	Paciente de 8 años con mordedura de perro en pierna izquierda, antecedentes de alergia a l
Distractor	Amoxicilina sola
Distractor	Clindamicina sola
Distractor	Trimetoprima sulfametoxazol + clindamicina
Distractor	Amoxicilina clavulanico
Item Nro	72
Enunciado	¿Qué cambios deben hacerse en la medicación de una mujer de 43 años con diabetes 2 , HT
Distractor	Aumento de lisinopril, cambio de atorvastatina a rosuvastatina
Distractor	Aumento de dosis de lisinopril y de atorvastatina
Distractor	No cambios de lisinopril ni atorvastatina
Distractor	Aumento de lisinopril sin cambio mde dosis de atorvastatina
Item Nro	73
Enunciado	Después de la colocación de catéter vesical ¿cuál de los siguientes pasos es el más apropi
Distractor	Medición de PSA

Distractor	TAC de pelvis sin contraste
Distractor	Pedir estudio urodinámico
Distractor	Instalar tratamiento con tamsulosina
Item Nro	74
Enunciado	¿Cuál de los siguientes pasos es el más adecuado para una mujer de 35 años con IMC 30, q
Distractor	Programar pruebas de ph esofágico
Distractor	Examen ECG, ergometría
Distractor	Tomar omeprazol 30 min antes de las comidas
Distractor	Programar esofagogastroduodenoscopia
Item Nro	75
Enunciado	¿Cuál de los siguientes pasos es el más adecuado para evaluar un nódulo tiroideo de 2 a 3
Distractor	Aspirado del nódulo con aguja
Distractor	Medición de Ig estimulante de tiroides
Distractor	Radionucleido scan con I 131
Distractor	Tac de cuello
Item Nro	76
Enunciado	¿Cuál de las siguientes preguntas ayuda más en la sospecha diagnostica de estenosis espi
Distractor	¿Tiene dolor intermitente igual a electricidad o shock y que se irradia a pierna y pie?
Distractor	¿Empeora a la mañana?
Distractor	¿Ir hacia atrás le alivia el dolor?
Distractor	¿Inclinarse hacia adelante alivia el dolor?
Item Nro	77
Enunciado	¿Cuál es el próximo estudio en un varón de 57 años con síndrome de piernas inquietas, má
Distractor	CPK
Distractor	Test función hepática
Distractor	TSH
Distractor	Niveles de ferritina
Item Nro	78
Enunciado	¿Cuál de los siguientes es el próximo paso con una paciente de 15 años quien ingiere píldo
Distractor	Jarabe de ipeca
Distractor	Iniciar ácido dimercaptosuccinil
Distractor	Carbón activado
Distractor	Infusión desferrioxamina
Item Nro	79
Enunciado	¿Cuál es el patógeno más probable que puede causar diarrea y vómitos leves a moderados
Distractor	Shigella
Distractor	Enterotoxinas por estafilococos aureus
Distractor	Norovirus
Distractor	Clostridium dificile

Item Nro	80
Enunciado	¿Cuál de las siguientes medicaciones es la más adecuada para un paciente anciano que vive con hipertensión arterial?
Distractor	Lorazepam oral
Distractor	Labetalol IV
Distractor	Hidralazina IV
Distractor	Enalapril oral
Item Nro	81
Enunciado	¿Cuál es el estudio más apropiado para paciente con sangrado gastrointestinal inferior, luego de un episodio de hemorragia por úlcera péptica?
Distractor	Gamagrafia nuclear
Distractor	Colonoscopia inmediata
Distractor	Laparotomía
Distractor	Angiografía abdominal
Item Nro	82
Enunciado	¿Cuál de las siguientes terapias es la más adecuada para un paciente con enf de graves con insuficiencia cardíaca congestiva?
Distractor	Propranolol solo
Distractor	Metimazol +propranolol
Distractor	Propiltiouracilo + propranolol
Distractor	Metimazol solo
Item Nro	83
Enunciado	¿Cuál es el próximo paso para un paciente fumador con nódulo espiculado de 2,5 cm visualizado en la tomografía axial computarizada?
Distractor	Obtener esputo con extendido y cultivo
Distractor	Biopsia transbronquial
Distractor	Esputo y citología
Distractor	Escisión quirúrgica
Item Nro	84
Enunciado	¿Cuál es el próximo paso en una mujer de 72 años con diagnóstico de fallo cardíaco reciente?
Distractor	Adición de carvedilol
Distractor	Aumentar dosis de furosemida
Distractor	Adición de espironolactona
Distractor	Adición de hidralazina e isosorbide
Item Nro	85
Enunciado	¿Cuál es la medicación más apropiada para administrar a un paciente de 17 años con ingesta de alcohol?
Distractor	Lorazepam
Distractor	Flumazenil
Distractor	Naloxona
Distractor	Fomepizole
Item Nro	86
Enunciado	En adición a aspirina y estatinas ¿cuál de las siguientes medicaciones es la más apropiada para un paciente con hipertensión arterial?
Distractor	Metoprolol
Distractor	Lisinopril

Distractor	Mononitrato de isosorbide
Distractor	Candesartan
Item Nro	87
Enunciado	¿Cuál es la evaluación más apropiada para un varón de 47 años con síntomas nuevos de as
Distractor	Test de metacolina
Distractor	Nivel de IgE
Distractor	Testeo de parches dérmicos para alergia
Distractor	Espirometría con test de broncodilatación
Item Nro	88
Enunciado	¿Cuál es la explicación más probable para un rash maculopapular difuso y fracaso renal ag
Distractor	Glomerulonefritis postestreptococica
Distractor	Enfermedad de Alport
Distractor	Nefropatía por Ig A
Distractor	Nefritis intersticial aguda
Item Nro	89
Enunciado	Mujer de 75 años con EPOC reagudizado con Rx de tórax con neumonía multifocal, luego de
Distractor	Adicionar azitromicina, cambiar pipertazo a meropenem mas vancomicina
Distractor	Cambio vancomicina por daptomicinamas piperacilina tazobactam
Distractor	Discontinuar piperacilina adicionar levofloxacina mas vancomicina
Distractor	Discontinuar piperacilina y ceftriaxona, continuar con vancomicina
Item Nro	90
Enunciado	Un paciente de 31 años con anemia de células falciformes con cólico biliar sin evidencia de a efectuar?
Distractor	TAC de abdomen y pelvis
Distractor	Colangiografía
Distractor	Endoscopia alta
Distractor	Colangiopancreatografía retrograda endoscópica
Item Nro	91
Enunciado	¿Cuál de las siguientes decisiones terapéuticas es la más apropiada para una mujer de 62 a
Distractor	Reemplazo de alendronato por acido zolendronico
Distractor	Continuar con alendronato a igual dosis
Distractor	Reemplazar alendronato por calcitonina
Distractor	Doble dosis semanal de alendronato
Item Nro	92
Enunciado	¿Cuál de los siguientes medicamentos se puede agregar de un paciente de 62 años con HT.
Distractor	Verapamil
Distractor	Ramipril

Distractor	Amlodipina
Distractor	Diltiazem
Item Nro	93
Enunciado	¿Cuál de los siguientes tipos de cáncer está asociado a síndrome paraneoplásico con hiper
Distractor	Mesotelioma
Distractor	Cáncer de pulmón de células escamosas
Distractor	Cáncer de pulmón de pequeñas células
Distractor	Adenocarcinoma de pulmón
Item Nro	94
Enunciado	¿Cuál de los siguientes pasos es el más adecuado para una niña de 13 años con historia de disimetría del brazo derecho?
Distractor	Observar con seguimiento diario de cefalea
Distractor	Obtener TAC de cerebro
Distractor	Efectuar PL urgente
Distractor	RMN de cerebro
Item Nro	95
Enunciado	Varón de 65 años fumador, EPOC estable con broncoespasmo estable. Diabetes 2 tratada con insulina. ¿Cuáles de los siguientes estudios pueden hacerse para determinar riesgo vascular?
Distractor	Test de perfusión miocárdica con stress
Distractor	Angiografía coronaria
Distractor	RMN cardíaca con stress con dobutamina
Distractor	Test stress con ejercicio
Item Nro	96
Enunciado	Mujer de 54 años, obesa, HTA, fumadora crónica, con fatiga severa y somnolencia, varios meses de evolución. ¿Cuál de las siguientes evaluaciones es la más apropiada para determinar por qué un paciente tiene estos síntomas?
Distractor	Medición de T4 libre
Distractor	Testeo de gases arteriales
Distractor	Test stress cardíaco
Distractor	Espirometría.
Item Nro	97
Enunciado	¿Cuál de las siguientes evaluaciones es la más apropiada para determinar por qué un paciente tiene estos síntomas?
Distractor	Radiografía de abdomen
Distractor	TAC de abdomen y pelvis con o sin contraste
Distractor	Cultivos de sangre
Distractor	Ecografía renal
Item Nro	98
Enunciado	¿Cuál es la intervención más importante en un varón de 75 años, fumador, Presión Arterial: 160/90 mmHg?
Distractor	Reparar aneurisma de aorta
Distractor	Cesación de tabaco

Distractor	Iniciar IECA
Distractor	Reemplazar aneurisma y arco aórtico
Item Nro	99
Enunciado	¿Cuál de los siguientes hallazgos del fondo de ojo es más correlacionable en un paciente c
Distractor	Edema del disco óptico
Distractor	Alteraciones arteriovenosas
Distractor	Microaneurismas
Distractor	Atrofia óptica
Item Nro	100
Enunciado	¿Cuál de los siguientes tests es el indicado en un varón de 44 años con historia de etilismo
Distractor	AC Ig M anticore HB
Distractor	Nivel de alfa feto proteína
Distractor	Colonoscopia
Distractor	Endoscopia alta