



" 2025: Año del Bicentenario del Fallecimiento del Dr. Bernardo de Monteagudo"

SALA DE SITUACION DE SALUD




**SE
32**



Hasta 30/07/2025: 181 casos

Casos de sarampión según departamentos. Bolivia. Año 2025



Se llevan a cabo
intervenciones específicas,
incluyendo bloqueos
epidemiológicos y campañas de
vacunación masivas.




Fuente: Ministerio de Salud de Bolivia






Número de casos de sarampión notificados según semana por fecha de aparición del salpullido. Año 2023 al 29/7/2025. EEUU



Año 2025: 1333 casos confirmados

- 40 jurisdicciones
- 29 brotes: 87% de los casos (1156) estuvieron asociados a un brote
- 3 fallecidos

Número de casos de sarampión notificados por año de inicio del exantema, desde la eliminación del sarampión (1998) hasta el 19/7/2025. Canadá



Año 2025: 4.206 casos notificados de sarampión

- 3.878 confirmados (92,2%)
- 10 jurisdicciones

SE29: 212 casos confirmados en 7 jurisdicciones (Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Nueva Brunswick, Nueva Escocia y Ontario).



**Número de notificaciones de Enfermedad Febril
Exantemática según semana epidemiológica. Argentina. SE1
a SE30 de 2025. N= 2.759**


35 casos confirmados de sarampión

13 casos en CABA




21 casos en la Provincia de Bs As

1 San Luis



**Número de casos confirmados de Sarampión según clasificación epidemiológica y
semana epidemiológica. Argentina.
SE1 a SE31 de 2025. N= 35**



EFE: Distribución de casos notificados y confirmados por jurisdicción en Argentina. Tasa cada 100 mil habitantes y notificaciones esperadas para el período actual.
SE1 a SE30 de 2025*

Tasa mínima anual esperada de casos sospechosos de sarampión/rubéola*:
2 casos por cada 100.000 hab.

Caso de EFE (caso sospechoso de sarampión/rubéola): Persona de cualquier edad con fiebre (temperatura axilar >38°C) y exantema, independientemente del antecedente vacunal, o bien que un personal de salud sospeche sarampión o rubéola


SARAMPIÓN ARGENTINA

Jurisdicción	Confirmado	Notificaciones totales actuales	Tasa c/100-mil	Notificaciones mínimas esperadas actuales	Notificaciones esperadas anuales
Buenos Aires	21	1691	9,2	209	367
CABA	13	638	20,7	35	62
Catamarca		11	2,5	5	9
Chaco		26	2,1	14	25
Chubut		21	3,1	8	13
Córdoba		68	1,7	45	79
Corrientes		5	0,4	13	23
Entre Ríos		39	2,7	16	29
Formosa		2	0,3	7	13
Jujuy		32	3,9	9	16
La Pampa		19	5,1	4	7
La Rioja		1	0,2	5	8
Mendoza		60	2,9	24	42
Misiones		9	0,7	15	27
Neuquén		8	1,1	8	14
Río Negro		6	0,8	9	16
Salta		12	0,8	17	30
San Juan		11	1,3	9	16
San Luis	1	8	1,5	6	11
Santa Cruz		10	2,4	5	8
Santa Fe		49	1,3	42	73
Santiago del Estero		13	1,3	12	21
Tierra del Fuego		2	1,0	2	4
Tucumán		18	1,0	20	36
Total	35	2759	5,8	541	949

Referencia(*):casos notificados corresponden hasta la SE26, y casos confirmados hasta 26/7/2025.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

**Número de casos confirmados de Sarampión según grupo etario y antecedente de vacunación. Argentina.
SE1 a SE31 de 2025. N= 35.**



77,1% (27) casos deberían haber recibido 1 o 2 dosis de vacuna de acuerdo a la edad





Medidas ante un caso **SOSPECHOSO**:



- **Aislamiento respiratorio** de la persona afectada (7 días siguientes del inicio del exantema). Utilización de barbijo para la persona con sintomatología y para acompañantes
- Informar a la autoridad sanitaria la sospecha clínica sin esperar resultados de laboratorio.
- Confeccionar de manera completa la **Ficha de investigación de caso sospechoso** de EFE (sarampión/rubéola) Reportar los datos en el SNVS 2.0 “Enfermedad Febril Exantemática-EFE”
- En caso de antecedente de vacunación con vacuna triple o doble viral 5-21 días previos a la aparición de síntomas, podría tratarse de un Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) y debe notificarse.
- **Recolectar muestras para el diagnóstico** etiológico
- Corroborar el antecedente de vacunación de los contactos y proceder a vacunar dentro de las 72 horas del contacto



MEDIDAS DE PREVENCIÓN


Todas las personas desde el año de vida deben tener esquema de vacunación completo contra el sarampión y la rubéola, según Calendario Nacional de Vacunación:



- De **12 meses a 4 años**: deben acreditar **UNA DOSIS** de vacuna triple viral.
- Niños **de 5 años y más**, adolescentes y personas adultas deben acreditar **al menos DOS DOSIS** de vacuna con componente contra sarampión y rubéola aplicada después del año de vida (doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para sarampión y rubéola.
- Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse.
- El antecedente de vacunación se deberá constatar
(registro nominal de vacunación o por presentación del carnet de vacunación)



Número total de casos sospechosos de dengue a la SE 28 en 2025, 2024 y promedio de los últimos 5 años. Subregión del Cono Sur.





SE 28/2025: 20.314 nuevos casos sospechosos de dengue (<70% SE27/2024 y <9% del promedio de últimos 5años)

Casos de dengue en comparación con el promedio de las últimas cuatro semanas. SE 28/Año 2025



Casos reportados de Dengue por semana y año. SE 1/2024 - SE 30/2025


20242025



Casos sospechosos de Dengue por semana epidemiológica según país. Cono Sur, SE 1/2024 a SE 30/2025

País	Serotip os	SE/Año 2025	Total casos	Tasa acumulada de Incidencia (por 100mil hab)
Brasil	DEN 1,2,3,4	30	3.154.716	1.482,4
Paraguay	DEN 1,2,3	30	22.475	320.4
Bolivia	DEN 1,2	27	27.880	221,6

**Dengue: Casos de dengue por semana epidemiológica de fecha mínima.
SE31/2024 a SE30/2025. Argentina.**



77.213 casos sospechosos

**8360 casos confirmados
por laboratorio**

**8705 por nexo clínico
epidemiológico**

**total de 17065
casos de dengue**

Durante las últimas cuatro semanas,
se registraron principalmente casos
en los departamentos **Patiño,**
Pilagás y Formosa Capital, en la
provincia de Formosa.




La incidencia acumulada a nivel país para la temporada actual es de 36 casos cada 100.000 habitantes

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación



Curva epidémica de SFAI desde la SE 32/2024 hasta la SE 31/2025 (n=10216)




SE 32 de 2024 a SE 31/2025: 1252 casos confirmados por laboratorio de Dengue
0 activos

Fuente: SNVS. Dirección de Epidemiología




**Enfermedad Tipo Influenza: Corredor endémico semanal.
SE 1 a 29 de 2025. Argentina.**




Fuente: Ministerio de Salud de la Nación



**Bronquiolitis en menores de 2 años: Corredor
endémico semanal. SE 1 a 29 de 2025.
Argentina.**




**Casos e Incidencia Acumulada de
Bronquiolitis en menores de 2 años por
100.000 habitantes. Años 2015-2025.
SE29/2025. Argentina.**



Fuente: Ministerio de Salud de la Nación




Distribución de influenza, SARS-CoV-2 y OVR identificados por Semana epidemiológica. SE01/2024 a SE29/2025. Argentina.



Fuente: Ministerio de Salud de la Nación




Distribución de notificaciones de virus influenza según tipos, subtipos y linajes y porcentaje de positividad, por Semana epidemiológica. SE01/2017- SE29/2025. Argentina.



Fuente: Ministerio de Salud de la Nación



Número de casos de Covid según fecha de notificación. 1/7/2024 al 2/8/2025. Provincia de Tucumán




Laboratorio de Salud Pública

Durante las semanas 26 y 27, se detectaron casos de la variante Ómicron **XGF**. Esta ha sido recientemente clasificada como "Variante bajo Monitoreo" (VUM), con un bajo riesgo adicional para la salud pública a nivel mundial.
Fuente: Ministerio de Salud de la Nación



**Corredor Endémico de Enfermedad Tipo Influenza ETI. Provincia de Tucumán. Año
2025. SE 1 a SE 30 de 2025**




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Proporción de virus respiratorios desde la SE 1 a 31 de 2025. UC y UMA.
Provincia de Tucumán. (n= 5060)



SE 31

INFLUENZA
3% (2)

SARS-COV-2
5% (3)

OVR
92% (55)

VRS
49% (27)


RINOVIRUS
47% (26)

MPV
4% (2)

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0 – Laboratorio de Salud Pública.




Corredor Endémico de Bronquiolitis. Provincia de Tucumán. Año 2025
SE 1 a SE 30 de 2025



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor Endémico de Neumonía. Provincia de Tucumán. Año 2025
SE 1 a SE 30 de 2025




- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0




Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años. Provincia de Tucumán. Año 2025
SE 1 a SE 30 de 2025



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor Endémico de Alacranismo. Provincia de Tucumán. Año 2025
SE 1 a SE 30 de 2025



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacterianas Provincia de Tucumán. Año 2025 hasta SE 31 (n= 27)

Casos acumulados de Meningitis bacteriana, según agente etiológico. Hasta la SE 31. Tucumán 2025

Meningococo	2
Neumococo	9
Haemophilus Influenzae	3
TBC	2
Bacterianas/otras	9
Bacteriana s/e	2
Total	27

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán. Año 2025 hasta SE 31 (n= 11)

- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología.

