Ministerio de Salud Pública
Dirección de Epidemiología

GOBIERNO DE TUCUMÁN

" 2025: Año del Bicentenario del Fallecimiento del Dr. Bernardo de Monteagudo"

SALA DE SITUACION DE SALUD

SE 52

Ministerio de Salud Pública
Dirección de Epidemiología
GOBIERNO DE TUCUMÁN

Alerta epidemiológica Síndrome Pulmonar por Hantavirus en la Región de las Américas

Hasta la (SE) 47 de 2025: 8 países de la Región de las Américas (principalmente del Cono Sur) han notificado casos confirmados de síndrome pulmonar por hantavirus (SPH).
229 casos y 59 defunciones (tasa de letalidad regional de 25,7%)

Argentina: país con más casos (66 confirmados hasta la SE 47).

Bolivia y Paraguay: Duplicaron o superaron su incidencia histórica

La mayoría de los casos ocurren por **contacto con roedores reservorio y sus excretas.**

Evidencia de **transmisión persona a persona en el Cono Sur**, vinculada al virus Andes (exposición estrecha y prolongada)

Predominan las **exposiciones en zonas rurales y turismo ecológico**

Casos de síndrome pulmonar por hantavirus reportados en la Región de las Américas durante 2025 (hasta la SE 47)



Fuente: OPS

Ministerio de Salud Pública
Dirección de Epidemiología
GOBIERNO DE TUCUMÁN

Alerta epidemiológica Síndrome Pulmonar por Hantavirus en la Región de las Américas

Hantavirus en Argentina (SE 1-47, 2025)

66 casos confirmados

La **región Centro** concentra la mayoría de los casos (64%), seguida por el Noroeste (21%).

Principal antecedente: **contacto con roedores o sus desechos** (55%), seguido por la residencia o excursiones en zonas rurales.

Los síntomas predominantes son **fiebre (95%)**, dolores musculares (75%) y dolor de cabeza (61%).

Se reportaron **21 fallecimientos**, lo que representa una letalidad del **32%**. Promedio de los últimos cuatro años (15,4%).

Fuente: OPS

Ministerio de Salud Pública
Dirección de Epidemiología

GOBIERNO DE TUCUMÁN

Influenza A(H3N2) ARGENTINA

Detección en Argentina de los primeros casos de influenza **A(H3N2)** (subclado K) en **dos adolescentes de Santa Cruz y un niño de CABA**.

Casos **confirmados mediante secuenciación genómica por el Instituto Malbrán**.
Los pacientes **evolucionaron favorablemente** y sin complicaciones.

La circulación de virus respiratorios en el país se encuentra dentro de los niveles normales para la época.

El **subclado K** presenta cambios genéticos que facilitan su propagación, pero **no aumentan la severidad clínica** de la enfermedad.

El Ministerio de Salud y las provincias mantienen la vigilancia para detectar cambios en el comportamiento del virus y garantizar la atención.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

Ministerio de Salud Pública
Dirección de Epidemiología

GOBIERNO DE TUCUMÁN

ALERTA SARAMPIÓN

Sarampión: Es una enfermedad viral **altamente contagiosa**. Se transmite por gotas en el aire y puede permanecer sobre superficies o en el aire por hasta 2 horas.
No tiene tratamiento específico, pero **puede prevenirse con la vacunación**

Vigilancia Epidemiológica:

- Fortalecer la vigilancia de **Enfermedad Febril Exantemática (EFE): persona de cualquier edad con fiebre (>38°C) y exantema.**
- Todo caso sospechoso de EFE debe **notificarse de forma inmediata** al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) **y estudiarse por laboratorio**.

Medidas de Prevención (Esquemas de Vacunación):

•**12 meses a 4 años:** UNA DOSIS de vacuna triple viral.

•**Mayores de 5 años, adolescentes y adultos:** al menos DOS DOSIS de vacuna con componente contra sarampión (doble o triple viral) después del año de vida, o serología IgG positiva.

•**Personal de salud:** Acreditar dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso después del año de vida o serología IgG positiva.

•**Nacidos antes de 1965:** Se consideran inmunes y no necesitan vacunarse.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

Ministerio de Salud Pública
Dirección de Epidemiología

GOBIERNO DE TUCUMÁN

DENGUE: Bolivia, Brasil y Paraguay

Casos sospechosos de dengue por SE. 2025



Tasa de incidencia de dengue por 100.000 hab



Serotipos circulantes. 2025



Fuente: OPS

CASO SOSPECHOSO DENGUE

Toda persona que viva o haya viajado en los últimos 14 días previos al inicio de los síntomas a zonas con transmisión de dengue o presencia del vector, y presenta fiebre aguda, habitualmente de 2 a 7 días de evolución, y dos o más de las siguientes manifestaciones: náuseas o vómitos, exantema, cefalea o dolor retro orbitario, mialgia o artralgia, petequias o prueba de torniquete positiva (+), leucopenia con o sin cualquier signo de alarma o manifestación de gravedad.
La notificación deberá ser inmediata en el evento Dengue en el SNVS 2.0

TIPO DE MUESTRA: SUERO ESTÉRIL / LCR EN CASOS CON AFECTACION NEUROLÓGICA / TEJIDOS EN CASOS FATALES (preferentemente hígado, bazo, riñón, sin aditivos).
En algunos casos particulares, podrá solicitarse una muestra de orina estéril y/o sangre con EDTA (para qRT-PCR).

1 a 3 días de evolución	• NS1 Elisa • qRT-PCR • AISLAMIENTO VIRAL
4 a 6 días de evolución	• NS1 Elisa • qRT-PCR • AISLAMIENTO VIRAL + • IgM ELISA
≥ 7 días de evolución	• IgM ELISA • NEUTRALIZACION EN CULTIVOS CELULARES EN PAR SEROLÓGICO (Período agudo | convalecencia)

- En el contexto de brotes recientes de dengue se recomienda el estudio de pacientes en etapa aguda (1-6 días de evolución) de modo de priorizar la aplicación de métodos ELISA NS1, qRT-PCR y/o aislamiento viral, ya que puede darse la persistencia de los anticuerpos IgM/ IgG correspondientes a infecciones previas.
- En situación de epidemia o por requerimientos de manejo del paciente, si se decidiera incorporar test rápidos en una zona, los mismos deberán ser usados siguiendo el algoritmo de diagnóstico y bajo la realización de controles de calidad por otras metodologías en un porcentaje de muestras positivas y negativas.
- Las personas que hayan sido vacunadas contra el dengue en los 30 días previos al inicio de síntomas no deben ser estudiadas por laboratorio, salvo que se trate de casos de dengue grave o internados.

Elegí prevenir

Ministerio de Salud República Argentina

Fuente:
Ministerio de Salud de la Nación

Vigilancia de Dengue

- ✓ Considerar que **todo caso sospechoso debe ser estudiado por laboratorio** (ficha completa y muestra remitida al Laboratorio de Salud Pública).
- ✓ Las recomendaciones para el diagnóstico y clasificación de los casos se encuentran en el Algoritmo de Diagnóstico y Notificación de dengue a través del SNVS.



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA — GOBIERNO DE TUCUMÁN
Dirección de Epidemiología

FICHA DE INVESTIGACION DE CASOS DE SINDROME FEBRIL DENGUE-CHIKUNGUNYA-ZIKA SF

Definición de caso sospechoso: Persona de cualquier edad y sexo que presenta fiebre, de menos de siete (7) días de duración, acompañado de mialgias o cefalea, sin afección de las vías aéreas superiores y sin etiología definida.

1. DATOS DEL DECLARANTE

Provincia:_____ Departamento:_____ Localidad:_____
Establecimiento Notificante:_____ Fecha de Notificación: ____/____/____
Apellido y Nombre del Profesional:_____
Tel.:_____ Fax:_____ e-mail:_____

2. IDENTIFICACION DEL PACIENTE

Apellido y nombres:_____
Fecha de nacimiento ____/____/____ Edad: _____ Sexo: M ( ) F ( ) DNI: _____
Domicilio actual: _____ Tel. propio o vecino:_____
Referencia de ubicación domicilio:_____ Localidad_____
Urbano ( ) Rural ( ) Departamento_____ Provincia_____

3. DATOS CLINICOS

Fecha de inicio de la fiebre: ____/____/____ Fecha de la consulta: ____/____/____
Embarazo: Si ( ) No ( ) Fecha Ultima Menstruación (FUM): ____/____/____

	Si	No	Ign.		Si	No	Ign.		Si	No	Ign.
Fiebre (..... 38° C)				Dolor abdominal				Hepatomegalia			
Cefalea				Inyección conjuntival				Esplenomegalia			
Mialgias				Tos				Oligoanuria			
Artralgias				Disnea				Sind. confusional			
Dolor retro ocular				Taquipnea				Sind. meningeo			
Erupción				Prurito				Encefalitis u otras manifestaciones neurológicas			
Náuseas				Ictericia				Sind. Hemorrágico*			
Vómitos				(*) Especificar (marcar con una cruz): petequias☐ ; purpura☐ ; epistaxis☐ ; gingivorragia☐							
Diarrea				hemoptisis☐ ; melena☐ ; vómitos negros☐ ; otros.....							

Tensión: MIN ...../MAX..... **Pulso:**...../min. **Prueba del torniquete:** POS ( ) NEG ( ) **FR.**...../min
Hto:.....% GB:...../mm3. Fórmula: ...../...../...../...../..... Plaq:...../mm3. VSG:.....mm

4. DATOS EPIDEMIOLOGICOS

Dengue anterior: Si ( ) No ( ) Fecha: ___/___/___
Ocupación de riesgo:_____ Lugar de trabajo: Urbana ( ) Periurb ( ) Rural ( ) Silvestre ( )
Viajó durante los últimos 45 días? Si ( ) No ( ) Fecha: ___/___/___ Destino_____
_____ Fecha de regreso:___/___/___
Estuvo en el campo, monte, lugar de recreación? Si ( ) No ( ) Fecha: ___/___/___ Lugar_____
Conoce casos similares? Si ( ) No ( ) Quién/es? _____
ANTECEDENTE DE VACUNACIÓN (confirmar con carnet)
Antiamarílica: Si ( ) No ( ) Ign ( ) Última fecha de vacunación: ___/___/___
Fiebre Hemorrágica Argentina: Si ( ) No ( ) Ign ( ) Última fecha de vacunación: ___/___/___

Dirección de Epidemiología – Virgen de la Merced 196 3° piso – CP (4000) - Tel/Fax 0381-4302228 * 0381-156346779 * direpitucuman@gmail.com
División Virología – Laboratorio de Salud Pública – Mendoza 140 4° Piso – Tel. 0381-4535114 int. 505 -503-504 * dengueluc@gmail.com

Temporada 2025-2026: 5423 casos sospechosos de dengue, de los cuales 12 fueron confirmados por laboratorio:

- **2 casos autóctonos en Formosa**: Dptos. Pilagás (SE31) y Patiño (SE32).
- **2 casos** de la Provincia de Buenos Aires: **sin antecedente de viaje** de Tres de Febrero (SE31) y San Isidro (SE43).
- **8 casos con antecedente de viaje** a diferentes países con circulación (Bs As, CABA, Entre Ríos).

Casos de dengue según semana epidemiológica. Años 2010-2025 y detalle 2020-2025 con referencia (flecha roja) a la SE 45. Argentina.



*Estos eventos pueden corresponder a semanas epidemiológicas previas en relación con la fecha de inicio de síntomas, de consulta o de toma de muestra

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

DENGUE – TUCUMÁN

Curva epidémica de SFAI desde la SE 01/2025 hasta la SE 51/2025 (n=8117).
Temporada 25/26 (n= 676)



- **SE 31 de 2024 a SE 30/2025: 1252 casos confirmados de Dengue (sin nuevos casos entre las SE 26-30)**
- **SE 31-51 (Nueva temporada): sin casos activos**

Fuente: SNVS. Dirección de Epidemiología

VIRUS RESPIRATORIOS

Distribución de virus influenza por tipo, subtipo y linajes por semana epidemiológica y porcentaje de positividad – SE1/2024 a SE49/2025. Estrategia UMA. Argentina.



Influenza: Se registra un **leve incremento**, con un predominio de la circulación de **influenza B**

Virus Sincicial Respiratorio (VSR): Actualmente se encuentra en **niveles bajos** o "interestacionales“

SARS-CoV-2 (COVID-19): Presenta un **ascenso leve y sostenido** desde la semana 34, el cual se acentuó entre las semanas 43 y 45.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

Corredor Endémico Acumulado de Coqueluche. Provincia de Tucumán. Año 2025. SE 50 (n=5)



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA (ETI)

Corredor Endémico de Enfermedad Tipo Influenza ETI. Provincia de Tucumán. Año 2025
SE 1 a SE 50 de 2025



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Proporción de virus respiratorios desde la SE 1 a 51 de 2025. UC y UMA. Provincia de Tucumán. (n= 8078)



MUESTRAS ESTUDIADAS: **117**
TOTAL DE VIRUS IDENTIFICADOS: **15**
SE 51

SARS-COV-2
20% (3)

OVR
80% (12)

RINOVIRUS
75% (9)

PI
17% (2)

VRS
8% (1)

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0 – Laboratorio de Salud Pública.

Corredor Endémico de Bronquiolitis. Provincia de Tucumán. Año 2025
SE 1 a SE 50 de 2025



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Neumonía. Provincia de Tucumán. Año 2025
SE 1 a SE 50 de 2025



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Alacranismo. Provincia de Tucumán. Año 2025
SE 1 a SE 50 de 2025



REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años. Provincia de Tucumán. Año 2025
SE 1 a SE 50 de 2025



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

MENINGITIS

Nº de casos de Meningitis, según agente etiológico. SE 51. Tucumán 2025

Viral	19
Micótica	2
Bacteriana	35

Casos acumulados de Meningitis bacteriana, según agente etiológico. Hasta SE 51. Tucumán 2025

Meningococo	3
Neumococo	11
Haemophilus Influenzae	5
TBC	2
Bacterianas/otras	9
Bacteriana s/e	5
Total	35

REFERENCIAS
- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Bacterianas Provincia de Tucumán. Año 2025 hasta SE 51 (n= 35)



Corredor Endémico Acumulado de Meningitis Virales Provincia de Tucumán. Año 2025 hasta SE 51 (n= 16)



Fuente: Dirección de Epidemiología.