

SALA DE SITUACIÓN DE SALUD

SE 27



Alerta Epidemiológica Influenza estacional y otros virus respiratorios en el hemisferio sur


Ministerio de
Salud Pública
Dirección de
Epidemiología



GOBIERNO DE
TUCUMÁN

A nivel global, la actividad de influenza y VSR sigue el patrón estacional esperado:
Hemisferio norte: período interestacional con baja circulación viral
Hemisferio sur: temporada epidémica

Porcentaje de positividad por semana epidemiológica (SE) en la subregión de Brasil y el Cono Sur,
SE 1 del 2025 a SE 22 del 2026.



Fuente: OPS



Hemisferio sur:
luego de un periodo caracterizado por
una **predominancia de influenza
A(H3N2)**, se está observando un
incremento progresivo de influenza B.


Alerta Epidemiológica Influenza estacional y otros virus respiratorios en el hemisferio sur

Ministerio de
Salud Pública
Dirección de
Epidemiología




GOBIERNO DE
TUCUMÁN

Porcentaje de positividad por virus respiratorio y semana epidemiológica en Argentina, SE 1 del 2025 a SE 23 del 2026.



Muestras positivas influenza por subtipo y por semana epidemiológica en Argentina, SE 1 del 2025 a SE 22 del 2026.



94% correspondieron a influenza A. El 99% de muestras subtipificadas correspondieron a influenza A(H3N2).
Influenza B: el 100% de las muestras se identificaron como del linaje Victoria.

Fuente: OPS

VIRUS BUNDIBUGYO

R. D. del Congo- Uganda

La enfermedad del virus Bundibugyo (EVB) es una forma grave y a menudo mortal de la enfermedad del Ébola

Actualización 6/07

RDC reportó:

1561 casos confirmados

506 fallecimientos (T. Let 32.4%)

628 personas hospitalizadas en
aislamiento

La provincia de Ituri es la más afectada

Uganda:


**20 casos confirmados (16 personas
recuperadas)**

2 fallecimientos




The map is based on official information collected at the date of production. Given the evolving epidemiological situation in the affected areas, all data should be interpreted with caution.

Zonas afectadas por el brote de ébola en curso



Curva epidemiológica de casos de sarampión por SE de inicio de la erupción y fuente de exposición. **Canadá**, año 2026 (N=1.079)



SE 24: 6 casos nuevos

-3 jurisdicciones: Manitoba, Ontario, Quebec


Año 2026:

-41%: 5 a 17 años

-86% no vacunado

Fuente: Gobierno de Canadá. 22/06/2026

Casos semanales de sarampión según la fecha de aparición del sarpullido. **EEUU**, años 2025-2026



Año 2026: 2.170 casos


-51% casos tenía de 5 a 19 años

-93% sin registro o no vacunado

-6% requirió hospitalización


Fuente: CDC. 02/07/2026

Curva epidémica de casos de sarampión por SE de inicio de exantema.
México, 2025-2026.N=43.690



SE 25/2026: 136 casos EFE (13 Sarampión)


Casos de sarampión por SE de notificación. **Perú, año 2026.N=737**



95,9% (679) de casos
concentrados en Depto. Puno




Número total de casos sospechosos de dengue a la SE 22 en 2026, 2025 y promedio de los últimos 5 años.



Subregión del Cono Sur


SE 22: 26.013 nuevos casos sospechosos.
Disminución de 67% respecto a igual periodo 2025 y 72% respecto al promedio de los últimos 5 años



Subregión Andina


SE22: 5.624 nuevos casos sospechosos
Disminución de 8% respecto a igual periodo 2025 y 26% respecto al promedio de los últimos 5 años

SE 22: Países con aumento o disminución de casos de dengue en comparación con el promedio de las últimas cuatro semanas del 2026.



Fuente: 29/06/2026. Informe de la situación epidemiológica del dengue en las Américas

Casos sospechosos de Chikungunya en América, años 2022 a 2026




Año 2026

El 36,2% (58.728) de los casos notificados fueron casos confirmados. Representan el 51,2% de los casos confirmados en 2025.

Incidencia de casos notificados de Chikungunya por país.
América, año 2026




Fiebre Chikungunya: Casos confirmados y probables por semana epidemiológica según fecha mínima16. SE31/2025 a SE25/2026. Argentina.




La mayor carga de enfermedad se concentra en la región **NOA (96% del total)** predominio en **Salta, Tucumán y Jujuy**, donde se consolidan los principales focos de transmisión

Fiebre Chikungunya: Casos confirmados y probables por departamento a nivel nacional. SE1 a SE25/2026. Argentina.



Fuente : Ministerio de Salud de la Nación /Ministerio de Salud de Salta

Casos de dengue de la temporada 2025-2026 representados en el modelo de estimación de escenarios epidemiológicos (n=69). Argentina.




Casos sospechosos: 27.363
Casos confirmados: 69
Serotipos detectados:
DENV-1, DENV-2 y DENV-3.
Jurisdicciones con mas casos:
CABA y Bs As

**55% corresponden a casos sin
antecedente de viaje**

Fuente : Ministerio de Salud de la Nación

Curva epidémica de SFAI Temporada 25/26 desde la SE 31/2025 hasta la SE 26/2026 (n=7630).




SE 31-26 (Nueva temporada): 567 casos confirmados CHIKV


Fuente: SNVS. Dirección de Epidemiología

Casos confirmados de CHIKV. Tucumán SE 7 a la SE 26 del año 2026

Casos Confirmados y Probables CHIKV 5/07				
Area Operat	CONFIRMADO CHIKV	PROBABLE CHIKV	PROBABLE NEXO EPIDEMIOLOGICO CHIKV	Suma total
SE	230	35	6	271
SAN PABLO	98	14	8	120
SO	93	21	1	115
NE	37	9	1	47
NO	33	11	-	44
YB	19	4	1	24
BRS	19	4	-	23
ALDERETES	7	1	-	8
VMM	5	3	-	8
LULES	5	1	-	6
CONCEPCION	4	-	-	4
TAFI VIEJO	4	-	-	4
LEALES	1	2	-	3
LOS RALOS	3	-	-	3
EL TIMBO	2	-	-	2
ESTACION ARAOZ	1	1	-	2
FAMAILLA	1	1	-	2
LA FLORIDA	2	-	-	2
GRANEROS	1	-	-	1
LAMADRID	1	-	-	1
SIMOCA	1	-	-	1
TOTAL	567	107	17	691




Casos confirmados de CHIKV. Tucumán SE 7 a la SE 26 del año 2026



VIRUS RESPIRATORIOS

Distribución de influenza, SARS-CoV-2 y OVR identificados por Semana epidemiológica. SE01/2024 a SE24/2026. Argentina


Si bien el subtipo predominante durante 2026 es A (H3N2), se registraron casos aislados de influenza A (H1N1) y un ligero aumento de las detecciones de influenza B en las últimas semanas.



Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

VIRUS RESPIRATORIOS ARGENTINA


Casos de Influenza recibidos por el LNR por semana de toma de muestra según tipo y subtipo de virus. Argentina.
SE1 a SE23, Año 2026



Fuente: Ministerio de Salud de la Nación




Enfermedad Tipo Influenza: Corredor endémico semanal-
Históricos 5 años. SE 1 a 24 de 2026,. Argentina.




Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

Bronquiolitis en menores de 2 años: Corredor endémico semanal- Históricos 5 años. SE 1-24 de 2026. Argentina.



Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

Corredor Endémico de Enfermedad Tipo Influenza ETI. Provincia de Tucumán.
SE 1 a SE 25 / 2026







Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA (ETI)



Corredor Endémico de Enfermedad Tipo Influenza ETI según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 25 / 2026



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA (ETI)




Corredor Endémico de Enfermedad Tipo Influenza ETI según Grandes Hospitales. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 25 / 2026


Hospital Avellaneda




Hospital del Este



Hospital del Niño Jesús




Hospital Regional de Concepción



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Proporción de virus respiratorios desde la SE 1 a SE 26 / 2026. Provincia de Tucumán. (n= 3576)




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0 – Laboratorio de Salud Pública.

Corredor Endémico de Bronquiolitis. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 25 / 2026




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Neumonía. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 25 / 2026



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 25 / 2026



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

MENINGITIS



Nº de casos de Meningitis, según
agente etiológico. Hasta SE 26.
Tucumán 2026

Viral	17
Micótica	2
Bacteriana	7

Casos acumulados de
Meningitis bacteriana, según
agente etiológico.
Hasta SE 26. Tucumán 2026

Meningococo	1
Neumococo	0
Haemophilus Influenzae	1
TBC	0
Bacterianas/otras	5
Bacteriana s/e	0
Total	7

REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis
Bacterianas Provincia de Tucumán.
SE 1 a 26 2026. (n= 5)

Corredor Endémico Acumulado de
Meningitis Virales Provincia de Tucumán.
SE 1 a 26 2026. (n= 17)

Fuente: Dirección de Epidemiología.

