

SALA DE SITUACIÓN DE SALUD



SE 38



VIRUS BUNDIBUGYO

R. D. del Congo- Uganda

La enfermedad del virus Bundibugyo (EVB) es una forma grave y a menudo mortal de la enfermedad del Ébola

Actualización 20/09

RDC reportó:


7672 casos confirmados

3699 fallecimientos (T. Let 48%)

886 personas hospitalizadas en aislamiento

La provincia de Ituri es la más afectada (77% de los casos)


Zonas afectadas por el brote de ébola en curso




VIRUS BUNDIBUGYO

R. D. del Congo

Número de casos confirmados de la enfermedad por el virus de Bundibugyo en la República Democrática del Congo, por fecha de notificación, al 7 de septiembre de 2026




Número de muertes entre los casos confirmados de la enfermedad por el virus de Bundibugyo en la República Democrática del Congo por fecha de notificación, al 7 de septiembre de 2026



Fuente: OMS


Casos confirmados de sarampión por SE de inicio de exantema y país. Región de las Américas, SE34/2025 a SE36/2026



Fuente: OPS / OMS. Powerbi.com.18/09/2026



Casos sospechosos de dengue por SE. Año 2025 a SE 36/2026




Indicadores de dengue por SE. Año 2026

País	Semanas	Tasa acumulada de		
		incidencia (x 100mil hab.)	Total casos*	Serotipos
Bolivia	SE33	459,9	58.628	DEN 1,2
Brasil	SE 36	597,82	1.276.720	DEN 1,2,3,4
Paraguay	SE 35	141,42	10.034	DEN1,2,3

En la subregión del Cono Sur los casos cayeron un 63% respecto al año anterior, siendo Brasil el país que aporta el mayor volumen de casos

Fuente: OPS

Referencias(*): Incluye casos de Dengue sospechosos, probables, descartados y confirmados.



Hasta la SE 36, los casos se mantienen en **niveles bajos** y por debajo de los picos registrados en años epidémicos anteriores, sugiriendo una interrupción de la transmisión autóctona sostenida.

Hasta la SE 35, se notificaron **875 casos sospechosos:**

- **3 casos confirmados:** antecedente de viaje a Brasil y Ecuador, residentes en la Provincia de Buenos Aires y con identificación del serotipo **DENV-3.**
- **7 casos probables** (en Salta, Entre Ríos y Buenos Aires)



Fuente : Ministerio de Salud de la Nación

Tras atravesar un brote durante el primer semestre de 2026 (con pico en la SE 16 enfocado en Salta, Tucumán y Jujuy), la transmisión descendió progresivamente.

Nueva temporada (SE 31 a SE 36) se notificaron 132 casos sospechosos:

- **1 caso confirmado** (en el departamento de Orán, Salta).
- **6 casos probables**




Mantener una vigilancia intensificada del síndrome febril agudo inespecífico para la detección temprana de posibles nuevos focos de transmisión

Fuente : Ministerio de Salud de la Nación/ MSP Tucumán


Curva epidémica de SFAI desde la SE 38/2025 hasta la SE 37/2026 (n=7701). Nueva Temporada 26/27 (n= 64)

■ PROBABLE CHIKV ■ DESCARTADO DENGUE ■ DESCARTADO CHIKV ■ PROBABLE DENGUE
 ■ CONFIRMADO CHIKV ■ PROBABLE NEXO EPIDEMIOLOGICO CHIKV ■ SOSPECHOSO TOTAL DENGUE ■ SOSPECHOSO CHIKV




Fuente: SNVS. Dirección de Epidemiología

Enfermedad Tipo Influenza: Corredor endémico semanal.
SE 1 a 34 de 2026 . Argentina.




Casos e Incidencia Acumulada de ETI por 100.000 habitantes.
Años 2016-2026. SE 34. Argentina




Fuente : Ministerio de Salud de la Nación

Bronquiolitis en menores de 2 años: Corredor endémico
semanal. SE 1-34 de 2026 . Argentina.




Casos e Incidencia Acumulada de Bronquiolitis en
menores de 2 años por 100.000 habitantes.
Años 2016-2026. SE 34. Argentina.



Fuente : Ministerio de Salud de la Nación

Porcentaje de positividad de muestras estudiadas por técnica molecular para SARS-CoV2, influenza y VSR, por SE.
Estrategia UMA. SE1/2025 a SE36/2026. Argentina.



Año 2026:

- Influenza en descenso
- VSR en aumento desde la SE 24
- SARS-CoV-2 en niveles bajos



Fuente : Ministerio de Salud de la Nación

Casos de Influenza recibidos por el Laboratorio Nacional de Referencia por semana de toma de muestra según tipo y subtipo de virus. Argentina. SE1 a SE34, 2026.N=2624


El LNR recibió muestras provenientes de las 5 regiones del país:
Centro 40%; NOA 29%; Cuyo 16%, Sur 8%; y NEA 7%

Distribución proporcional de casos de Influenza por semana de toma de muestra según subclado identificado. SE1 a SE34, 2026.

- ✓ Influenza A(H3N2) predominó en todos los grupos de edad
- ✓ Influenza B Victoria se concentró en los menores de 20 años (65%)



Corredor Endémico de Enfermedad Tipo Influenza ETI. Provincia de Tucumán.
SE 1 a SE 36 / 2026







Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA (ETI)



Corredor Endémico de Enfermedad Tipo Influenza ETI según Áreas Programáticas. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 36 / 2026



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - Nº de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA (ETI)




Corredor Endémico de Enfermedad Tipo Influenza ETI según Grandes Hospitales. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 36 / 2026


Hospital Avellaneda




Hospital del Este



Hospital del Niño Jesús



Hospital Regional de Concepción




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Proporción de virus respiratorios desde la SE 1 a SE 37 / 2026.
Provincia de Tucumán. (n= 5387)




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0 – Laboratorio de Salud Pública.

**Proporción de virus respiratorios en niños de 2 a 6 años desde la SE 1 a SE 37 / 2026.
Provincia de Tucumán. (n= 1135)**




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0 – Laboratorio de Salud Pública.

Corredor Endémico de Bronquiolitis. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 36 / 2026




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Neumonía. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 36 / 2026



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 36 / 2026




REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Alacranismo. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 36 / 2026



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

MENINGITIS



Nº de casos de Meningitis, según
agente etiológico. Hasta SE 37.
Tucumán 2026

Viral	17
Micótica	2
Bacteriana	10

Casos acumulados de
Meningitis bacteriana, según
agente etiológico.
Hasta SE 37. Tucumán 2026

Meningococo	2
Neumococo	2
Haemophilus Influenzae	1
TBC	0
Bacterianas/otras	5
Bacteriana s/e	0
Total	10



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis
Bacterianas Provincia de Tucumán.
SE 1 a 37 2026. (n= 10)

Corredor Endémico Acumulado de
Meningitis Virales Provincia de Tucumán.
SE 1 a 37 2026. (n= 17)

Fuente: Dirección de Epidemiología.



Análisis de la Situación de Salud Pública: El Niño en las Américas, 2026-2027

Impactos previstos de El Niño en América Latina y el Caribe en 2026



La experiencia de episodios anteriores de El Niño, incluido el del 2023-2024, demuestra que puede tener repercusiones significativas en:


- Seguridad alimentaria
- Disponibilidad de agua
- Medios de subsistencia
- Salud pública
- Infraestructuras críticas

Fuente: OPS / OMS. Análisis de la Situación de Salud Pública: El Niño en las Américas, 2026-2027

Resumen de los principales riesgos para la salud pública en el contexto de El Niño, 2026-2027

Condiciones de sequía		Condiciones húmedas	
Riesgo para la salud pública	Nivel de riesgo	Riesgo para la salud pública	Nivel de riesgo
Desnutrición	Riesgo muy alto	Desnutrición	Riesgo muy alto
Cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua	Riesgo muy alto	Cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua	Riesgo muy alto
Estrés térmico	Riesgo muy alto	Malaria	Riesgo muy alto
Enfermedades arbovirales como el dengue, el zika, el chikunguña, el oropouche y la fiebre amarilla	Riesgo muy alto	Enfermedades transmitidas por arbovirus, como el dengue, el zika, el chikunguña, el oropouche y la fiebre amarilla	Riesgo muy alto
Sarampión	Riesgo muy alto	Sarampión	Riesgo muy alto
Malaria	Alto riesgo	Otras enfermedades transmitidas por vectores	Alto riesgo
Otras enfermedades transmitidas por vectores	Alto riesgo	Otras enfermedades prevenibles mediante vacunación	Alto riesgo
Otras enfermedades prevenibles mediante vacunación	Alto riesgo	Enfermedades respiratorias	Alto riesgo
Enfermedades respiratorias	Alto riesgo	Salud materno-infantil	Alto riesgo
Salud materno-infantil	Alto riesgo	Lesiones directas	Alto riesgo
Lesiones directas	Alto riesgo	Violencia de género	Alto riesgo
Violencia de género	Alto riesgo	Situaciones que requieren apoyo en materia de salud mental y psicosocial (MHPSS por su acrónimo en inglés)	Alto riesgo
Situaciones que requieren apoyo psicosocial y de salud mental (MHPSS por su acrónimo en inglés)	Alto riesgo	Accidentes causados por animales venenosos	Alto riesgo
Accidentes causados por animales venenosos	Alto riesgo	Enfermedades transmitidas por roedores	Riesgo moderado
Enfermedades transmitidas por roedores	Riesgo moderado	Rabia humana	Riesgo moderado
Rabia humana	Riesgo moderado	Biotoxinas: intoxicación por pescado y marisco	Riesgo moderado
Biotoxinas: intoxicación por pescado y marisco	Riesgo moderado	Miasis causada por el gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax)	Riesgo moderado
Miasis causada por el gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax)	Riesgo moderado	Estrés térmico	Riesgo moderado

Fuente: OPS / OMS. Análisis de la Situación de Salud Pública: El Niño en las Américas, 2026-2027



Fuente: OPS / OMS. Análisis de la Situación de Salud Pública: El Niño en las Américas, 2026-2027