


SALA DE SITUACIÓN DE SALUD

SE 40




Casos confirmados de sarampión por SE de inicio de exantema y país. Región de las Américas, SE36/2025 a SE38/2026



Fuente: OPS / OMS. Powerbi.com.28/09/2026




EEUU: Casos semanales de sarampión según la fecha de aparición del sarpullido. Agosto 2025 a Septiembre 2026



Año 2026: 3.659 casos
-30 brotes
-2 defunciones
-47 jurisdicciones


Fuente: CDC. 24/09/2026

México: Curva epidémica de casos de sarampión por semana epidemiológica de inicio de exantema, 2025-2026




Fuente: Ministerio de Salud de México. 02/10/2026

Guatemala: Casos de Sarampión por SE de notificación según criterio de confirmación · SE 1 – SE 39 de 2026



Año 2026: 34.153 casos (65,4% confirmados por criterio clínico)
-30 brotes
-47 defunciones (0,14% letalidad)


Perú: Curva epidémica de casos confirmados de sarampión por semana epidemiológica. SE 1-39.



Se reportaron 2592 casos confirmados. El 56% se notificaron en la Región Puno (tasa 120 casos x 100 mil hab.)



Casos sospechosos de dengue por SE. Año 2025 a SE 38/2026



Indicadores de dengue por SE. Año 2026


País	Semanas	Tasa acumulada de incidencia (x 100mil hab.)	Total casos*	Serotipos
Brasil	SE 38	614,6	1.312.636	DEN 1,2,3,4
Perú	SE 37	170,53	59.553	DEN1,2,3
Bolivia	SE 33	459,9	58.628	DEN 1,2
Paraguay	SE 38	147,9	10.494	DEN1,2,3

Los casos notificados de dengue en la subregión del Cono Sur disminuyeron un 18,7% respecto al año anterior.

Perú registró un aumento del 80% respecto a igual periodo 2025.

Fuente: OPS

Referencias(*): Incluye casos de Dengue sospechosos, probables, descartados y confirmados.



Se mantiene una interrupción de la transmisión viral autóctona sostenida a nivel nacional

Hasta la SE 37, se notificaron **698 casos sospechosos**:

- **3 casos confirmados**: antecedente de viaje a Brasil y Ecuador, residentes en la Provincia de Buenos Aires y con identificación del serotipo **DENV-3**.
- **8 casos probables** (en Salta, Chaco y Buenos Aires)

Fuente : Ministerio de Salud de la Nación



Tras atravesar un brote durante el primer semestre de 2026 (con pico en la SE 16 enfocado en Salta, Tucumán y Jujuy), la transmisión descendió progresivamente.

Nueva temporada (SE 31 a SE 37) se notificaron 146 casos sospechosos:


- **1 caso confirmado** en Orán (Salta), antecedente de viaje a Bolivia
- **5 casos probables** en Salta




Mantener una vigilancia intensificada del síndrome febril agudo inespecífico para la detección temprana de posibles nuevos focos de transmisión

Fuente : Ministerio de Salud de la Nación/ MSP Tucumán

Curva epidémica de SFAI desde la SE 40/2025 hasta la SE 39/2026 (n=7706). Nueva Temporada 26/27 (n= 122)




Detecciones de influenza según subtipo. 01/08/2025 a 27/09/2026. Países del cono Sur: Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile



Fuente: OMS. Flu Net. Al 02/10/2026

Distribución de influenza, SARS-CoV-2 y OVR identificados por Semana epidemiológica. SE01/2025 a SE36/2026. Argentina




Año 2026:

- Influenza en descenso (sin embargo incremento de IB desde SE15)
- VSR en aumento
- SARS-CoV-2 permanece niveles bajos

Fuente : Ministerio de Salud de la Nación


VIRUS RESPIRATORIOS ARGENTINA

Distribución de influenza por tipo, subtipo y linaje, SARS-CoV-2 y OVR identificados por SE, por región. SE01/2025 a SE36/2026. Argentina.






Enfermedad Tipo Influenza: Corredor endémico semanal.
SE 1 a 36 de 2026 . Argentina.




Casos e Incidencia Acumulada de ETI por 100.000 habitantes.
Años 2016-2026. SE 36. Argentina



Fuente : Ministerio de Salud de la Nación

**Bronquiolitis en menores de 2 años: Corredor endémico
semanal. SE 1-36 de 2026 . Argentina.**




**Casos e Incidencia Acumulada de Bronquiolitis en
menores de 2 años por 100.000 habitantes. Años 2016-2026. SE 36.
Argentina.**



Fuente : Ministerio de Salud de la Nación

Corredor Endémico de Enfermedad Tipo Influenza ETI. Provincia de Tucumán.
SE 1 a SE 38 / 2026




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA (ETI)




Corredor Endémico de Enfermedad Tipo Influenza ETI según Grandes Hospitales. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 38 / 2026


Hospital Avellaneda




Hospital del Este



Hospital del Niño Jesús




Hospital Regional de Concepción



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Proporción de virus respiratorios desde la SE 1 a SE 39 / 2026. Provincia de Tucumán. (n= 5685)



MUESTRAS ESTUDIADAS: **162**
TOTAL DE VIRUS IDENTIFICADOS: **102**

SE 39

INFLUENZA
15% (15)

SARS-COV-2
3% (3)

OVR
82% (84)


RINOVIRUS
80% (67)

VRS
19% (16)

ADV
1% (1)


Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0 – Laboratorio de Salud Pública.

Corredor Endémico de Bronquiolitis. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 38 / 2026




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Neumonía. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 38 / 2026




Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Diarreas en < 5 años. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 38 / 2026



Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

Corredor Endémico de Alacranismo. Provincia de Tucumán. SE 1 a SE 38 / 2026



- REFERENCIAS
- Zona de Éxito
 - Zona de Seguridad
 - Zona de Alerta
 - Zona Epidémica
 - N° de Casos

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a datos del SNVS 2.0

MENINGITIS



Nº de casos de Meningitis, según
agente etiológico. Hasta SE 39.
Tucumán 2026

Viral	21
Micótica	0
Bacteriana	12

Casos acumulados de
Meningitis bacteriana, según
agente etiológico.
Hasta SE 39. Tucumán 2026

Meningococo	2
Neumococo	5
Haemophilus Influenzae	1
TBC	0
Bacterianas/otras	4
Bacteriana s/e	0
Total	12



REFERENCIAS

- Zona de Éxito
- Zona de Seguridad
- Zona de Alerta
- Zona Epidémica
- Nº de Casos

Corredor Endémico Acumulado de Meningitis
Bacterianas Provincia de Tucumán.
SE 1 a 39 2026. (n= 12)

Corredor Endémico Acumulado de
Meningitis Virales Provincia de Tucumán.
SE 1 a 39 2026. (n= 21)

Fuente: Dirección de Epidemiología.



OCTUBRE

Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama

Concientizar sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de mama



**El cáncer de mama es el cáncer más
común y la causa más común de
muerte por cáncer en las mujeres de las
Américas.**

Fuente: OPS